


ኩፍኝ

ትንሽ ሽፍታ ብቻ አይደለም



ኩፍኝ በተለይም ለህጻናት እና ለትናንሽ ልጆች፣ አደገኛ ሊሆን ይችላል።

የኩፍኝ ምልክቶች በተለምዶ የሚከተሉትን ያካትታሉ፦



ከፍተኛ ትኩሳት
(ከ 104°F በላይ ሊጨምር የሚችል)



ሳል



የአፍንጫ ንፍጥ



ቀይ እና/ወይም ውሃማ አይኖች



ሽፍታ
(ምልክቶች ከታዩ ከ3-5 ቀናት በኋላ ይከሰታል)

ኩፍኝ ከባድ ሊሆን ይችላል።

የኩፍኝ በሽታ የሳንባ ምች (ኒሞኒያ)፣ የአንጎል አብጠት (ኢንሰፍላዜንሲያ) እና ሞትን ጨምሮ ከባድ የጤና ችግሮች ያስከትላል።



ከ 5 ሰዎች ውስጥ 1 በኩፍኝ የተያዙ ሰዎች ሆስፒታል ይገባሉ።



ከ 20 ህጻናት ውስጥ 1 በኩፍኝ የተያዙ ህጻናት የሳንባ ምች ይያዛሉ፣ በትናንሽ ኩፍኝ በጣም የተለመደው ሞት ምክንያት።



ከ 1,000 ሰዎች ውስጥ 1 ኩፍኝ የአእምሮ አብጠት ያጋጥማቸዋል፣ ይህም ወደ አንጎል ጉዳት ሊያደርስ ይችላል።



ከ 1,000 ሰዎች ውስጥ ከ 1 እስከ 3 ሰዎች በኩፍኝ ይሞታሉ።

የረጅም ጊዜ ውስብስብ ችግሮች

በጣም አልፎ-አልፎ፣ ግን ገዳይ የሆነ በሽታ ሳብአኩት ስክለሮሲንግ ፓንኒሰፋላይትስ (subacute sclerosing panencephalitis) እንደ ሰው ከኩፍኝ ካገገመ በኋላ ከ 7 እስከ 10 ዓመታት ሊዳብር ይችላል።



ልጅዎን ለመጠበቅ የሚያስችል ሃይል አለዎት።

የኩፍኝ-ደግፍ-ሩቤላ (MMR) ክትባት መከተባቸውን በማረጋገጥ ለልጆችዎ አስተማማኝ እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ያቅርቡ። የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።