

الحصبة

ليست مجرد طفح جلدي بسيط

يمكن أن تشكل الحصبة خطرًا صحيًا، خاصة على الأطفال الرضع والصغار.



طفح جلدي

(يظهر بعد 3-5 أيام من بدء الأعراض)



عيون حمراء
و/أو دامعة



سيلان أنف



سعال



حمى شديدة

(قد تصل إلى أكثر من 104 درجة فهرنهايت / 40 درجة مئوية)

تشمل أعراض
الحصبة عادة:

يمكن أن تكون الحصبة خطيرة جدًا.

يمكن أن تسبب الحصبة مضاعفات صحية خطيرة، كالتهاب الرئوي وتورم الدماغ (التهاب الدماغ) والوفاة.

1 من بين كل 20 طفل مصاب بالحصبة يُصاب بالتهاب الرئوي، وهو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة لدى الأطفال الصغار.



1 من بين 5 أشخاص يُصابون بالحصبة يدخل إلى المستشفى.



1 من بين كل 1,000 مصاب بالحصبة يعاني من تورم في الدماغ، ما قد يؤدي إلى تلف في المخ.



تؤدي الحصبة إلى وفاة 1 إلى 3 أشخاص من بين كل 1,000 مصاب.



حماية طفلك بين يديك.

امنح أطفالك وقاية آمنة ومستدامة من الحصبة، بإعطائهم لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR). تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

المضاعفات طويلة الأمد

يمكن أن تسبب الإصابة بالحصبة ظهور مرض نادر جدًا لكنه مميت، يسمى التهاب الدماغ الشامل المصلب دون الحاد، وذلك بعد 7 إلى 10 سنوات من تعافي الشخص من الحصبة.

