


سرخکان

فقط یک دانه کوچک نیست

سرخکان می‌تواند خطرناک باشد، به‌ویژه برای نوزادان و کودکان خردسال.



دانه‌های جلدی
(3 تا 5 روز پس از شروع علائم ظاهر می‌شوند)



چشم‌های سرخ و/یا اشک‌آلود



بینی روان



سرفه



تب بلند
(ممکن است به بیشتر از 104 درجه فارنهایت برسد)

**علائم معمول
سرخکان
عبارت‌اند از:**

سرخکان می‌تواند جدی باشد.

سرخکان می‌تواند باعث مشکلات شدید صحنی مانند سینه‌بغل، ورم مغز (انسفالیت) و مرگ شود.

از هر 20 طفل مبتلا به سرخکان، 1 طفل به سینه‌بغل مبتلا می‌شود که شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرخکان در اطفال خردسال است.



از هر 5 نفر مبتلا به سرخکان، 1 نفر نیاز به بستری شدن پیدا می‌کند.



از هر 1000 فرد مبتلا به سرخکان، 1 نفر به ورم مغز (انسفالیت) دچار می‌شود که ممکن است سبب آسیب مغزی گردد.



1 تا 3 نفر از هر 1000 فرد مبتلا به سرخکان جان می‌بازند.



شما توانایی محافظت از فرزندتان را دارید.

با تزریق واکسین سرخکان، مامس و رویلا (MMR)، از اطفال تان در برابر سرخکان به‌صورت مؤثر و دوام‌دار محافظت کنید. به ارائه‌دهنده خدمات صحنی تان مشوره کنید.

مشکلات صحنی درازمدت

یک بیماری بسیار نادر اما مرگ‌بار به نام پان‌انسفالیت سکروزینگ تحت‌حاد ممکن است 7 تا 10 سال پس از بهبودی از سرخکان بروز آید.

