

UNE ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE EST OBSERVÉE ACTUELLEMENT

La rougeole se propage

Causée par un virus, la rougeole est une maladie très contagieuse. Elle peut être dangereuse, en particulier pour les bébés et les jeunes enfants. Protégez votre famille et votre communauté.



La rougeole se transmet par voie aérienne, lorsque quelqu'un tousse ou éternue. Le virus peut rester dans l'air pendant 2 heures après que la personne atteinte de rougeole a quitté les lieux. Elle est si contagieuse que près de 9 personnes sur 10 qui s'approchent d'une personne atteinte de la rougeole et qui ne sont pas protégées par la vaccination seront également infectées.

Les symptômes de la rougeole apparaissent entre 7 et 14 jours après le contact avec le virus. Les symptômes courants de la rougeole sont les suivants :



Une forte fièvre
(pouvant atteindre plus de 40 °C)



La toux



Le nez qui coule



Les yeux rouges et/ou larmoyants




Des rougeurs
(qui apparaissent 3 à 5 jours après l'apparition des symptômes)



La pneumonie



L'œdème cérébral
(encéphalite)



Peut-être même la mort

La meilleure façon de se protéger contre la rougeole...

c'est avec le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole). Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. La vaccination vous protège, ainsi que vos proches et votre communauté. Si vous n'êtes pas vacciné, il est conseillé de rester chez vous ou à l'écart des lieux très fréquentés jusqu'à ce que le nombre de cas de rougeole diminue dans votre région, notamment pour protéger les membres de votre famille qui pourraient être gravement atteints.

Si vous pensez être atteint de la rougeole ou si l'un de vos proches l'est, isolez-vous et appelez un professionnel de santé, un service d'urgence ou les urgences.

