

PENSEZ-VOUS AVOIR LA ROUGEOLE ?

Que faire en cas de suspicion de rougeole

La rougeole commence généralement par de la fièvre, une toux, un nez qui coule et des yeux rouges, puis évolue vers l'apparition de rougeurs. Si un membre de votre famille présente des symptômes de la rougeole :

Évitez tout contact avec les membres de votre famille

qui ne sont pas malades.

Tout le monde dans la maison doit rester enfermé pour éviter de contaminer vos voisins ou les personnes à l'extérieur de votre domicile.

Appelez immédiatement un médecin ou un hôpital pour leur signaler qu'un membre de votre foyer est atteint de la rougeole. Ils vous donneront des instructions.




Quand faut-il se rendre aux urgences

Si l'état de santé de la personne malade s'aggrave rapidement ou si elle présente l'un des symptômes ci-dessous, emmenez-la immédiatement aux urgences d'un hôpital.

N'ATTENDEZ PAS.



Des difficultés à respirer
(ou une respiration plus rapide que la normale)



Des douleurs qui se manifestent lors de la respiration ou de la toux



La déshydratation
(nez et bouche secs, diminution de la miction, pleurs sans larmes)



La fièvre ou les maux de tête ne s'arrêteront pas



La confusion, une baisse de vigilance ou une faiblesse grave



Une coloration bleue autour de la bouche, un manque d'énergie ou des difficultés à s'alimenter
(chez les enfants)

Demandez à quelqu'un d'appeler avant votre arrivée. Informez l'hôpital de l'arrivée d'une personne atteinte de la rougeole.