

IL Y A UNE ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE EN COURS

La rougeole se propage

La rougeole est une maladie très contagieuse causée par un virus. Elle peut être dangereuse, surtout pour les bébés et les jeunes enfants. Protégez votre famille et votre communauté.



La rougeole se transmet par l'air lorsqu'une personne malade tousse ou éternue. Le virus peut rester dans l'air pendant 2 heures après le départ d'une personne atteinte de rougeole. Il est si contagieux qu'environ 9 sur 10 personnes qui entrent en contact avec une personne atteinte de rougeole sans être protégées par la vaccination seront également infectées.

Les symptômes de la rougeole apparaissent 7 à 14 jours après le contact avec le virus. Les symptômes fréquents de la rougeole comprennent :



Forte fièvre
(avec des pics de plus de 40 °C/104 °F)



Toux



Écoulement nasal



Yeux rouges et/ou larmoyants



Éruption cutanée
(qui apparaît dans les 3-5 jours suivant le début des symptômes)


La rougeole peut causer de graves problèmes de santé, y compris :



Pneumonie



Inflammation du cerveau
(encéphalite)



Éventuellement, même la mort



La meilleure façon de se protéger contre la rougeole...

c'est le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR). Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Le vaccin vous permet de vous protéger vous-même, les gens autour de vous et votre communauté. Si vous n'êtes pas vacciné, envisagez de rester chez vous ou loin des zones à forte fréquentation jusqu'à la baisse des cas dans la région, surtout afin de protéger les membres de votre famille qui pourraient tomber gravement malades.

Si vous pensez que vous ou un membre de votre famille avez la rougeole, restez à distance des autres et appelez un fournisseur de soins de santé, de soins d'urgence ou le service des urgences.