

MASERN

SIND NICHT NUR EIN BISSCHEN AUSSCHLAG



Masern können insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich sein

Übliche
Masern-Symptome
sind unter anderem:



Hohes Fieber
(40 °C und mehr)



Husten



Schnupfen



**Entzündete
und/oder
feuchte Augen**



Ausschlag
(tritt 3-5 Tage nach
Symptomeintritt auf)

Masern können gefährlich sein.

Masern können schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen, wie Lungenentzündung und Hirnschwellung (Enzephalitis) und können zu Todesfällen führen.



1 von 5 Personen, die an Masern erkranken, wird ins Krankenhaus eingewiesen.



1 von 20 Kindern mit Masern entwickelt eine Lungenentzündung, die häufigste mit Masern verbundene Todesursache bei Kleinkindern.



1 von 1.000 Personen mit Masern entwickelt eine Hirnschwellung, die zu Hirnschäden führen kann.



1 bis 3 von 1.000 Masernfällen verlaufen tödlich.

Langzeitkomplikationen

Eine sehr seltene, jedoch tödliche Erkrankung namens subakute sklerosierende Panenzephalitis kann sich 7 bis 10 Jahre nach der Genesung von einer Masernerkrankung entwickeln.



Sie können Ihr Kind schützen.

Geben Sie Ihrem Kind einen sicheren und langanhaltenden Schutz gegen Masern durch eine MMR-Impfung (Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln).