

現在、麻疹が流行中

麻疹はウイルスによって引き起こされる非常に感染力の強い病気です。特に乳幼児にとって危険な感染症です。あなたの家族と地域社会を守りましょう。



麻疹は、感染者が咳やくしゃみをするすると空気中に広がります。麻疹にかかった人がその場を離れた後も、ウイルスは2時間空気中に留まる可能性があります。麻疹の感染力は非常に強く、麻疹にかかった人の近くにいる予防接種を受けていない人の約10人中9人が感染します。

麻疹の症状は、ウイルスに接触してから7～14日後に現れます。一般的な麻疹の症状は以下のとおりです。



高熱
(40℃以上になることもある)



咳



鼻水



目の充血
や涙目



発疹
(症状が始
めてから3～5
日後に発症)


麻疹は、以下のような重度の健康障害を引き起こす可能性があります。



肺炎



脳腫脹
(脳炎)



死に至る
可能性

麻疹から身を守る最善の方法は...

麻疹、おたふくかぜ、風疹 (MMR) ワクチンを接種することです。予防接種を受けるのに遅すぎることはありません。予防接種により、あなた自身、周りにいる人、そして地域社会を守ることができます。予防接種を受けていない場合は、地域における麻疹の症例が減少するまでは自宅で待機するか、人混みに近づかないようにしてください。特に、重症化する可能性のある家族を守るために重要です。

あなた自身または家族の誰かに麻疹の疑いがある場合は、他の人との接触を避け、医療機関、救急外来、または緊急治療室に連絡してください。

