

ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО У ВАШЕГО РЕБЕНКА КОРЬ?

Что делать, если у вашего ребенка есть подозрение на корь?

Корь обычно начинается с высокой температуры, кашля, насморка и покраснения глаз, а затем появляется сыпь. Если у кого-то из вашей семьи наблюдаются симптомы кори:

Изолируйте заболевшего от других членов семьи, не проявляющих симптомов заболевания.

Все в доме должны оставаться дома, чтобы не заразить соседей и других людей за пределами дома.

Немедленно позвоните врачу или в больницу и сообщите, что у вас дома находится человек, заболевший корью. Вам объяснят, что нужно делать.



Когда следует обращаться в отделение неотложной помощи?

Если состояние заболевшего стремительно ухудшается или возникают любые из перечисленных ниже симптомов, немедленно доставьте его в отделение неотложной помощи.

НЕ МЕДЛИТЕ!



Затрудненное или учащенное дыхание



Боль при дыхании или кашле



Признаки обезвоживания
(сухость во рту и носу, редкое мочеиспускание, плач без слез)



Устойчивая лихорадка или головная боль, которые не проходят



Спутанность сознания, снижение бдительности или выраженная слабость



Синюшность вокруг рта, общая вялость или трудности с кормлением
(у младенцев и детей младшего возраста)

Попросите кого-нибудь позвонить в больницу перед вашим приездом и сообщить, что едет человек с подозрением на корь.