


麻疹来袭

麻疹是病毒引发的高度传染性疾病。它可能很凶险尤其是对婴幼儿而言。请保护好家人和社区。

麻疹通过患者咳嗽或打喷嚏时产生的飞沫在空气中传播。麻疹患者离开后,病毒仍可在空气中存活长达 2 小时。麻疹的传染性极强,未接种疫苗的人在近距离接触麻疹患者后,感染风险高达 90%。



麻疹症状会在接触病毒后 7 至 14 天内显现。
常见的麻疹症状包括:



高热
(体温可达
40°C 以上)



咳嗽



流涕



**眼睛发红和/
或流泪**



皮疹
(症状出现后 3 至 5
天开始爆发)


麻疹可能引发严重的健康问题,包括:



肺炎



脑肿胀
(脑炎)



**甚至可能导
致死亡**



预防麻疹的最佳方式.....

是接种麻腮风三联 (MMR) 疫苗。接种疫苗永远都不算晚。接种疫苗有助于保护自己、身边的人以及社区。如果您尚未接种疫苗,在当地麻疹病例数量下降之前,建议考虑居家或避免前往人群密集场所,尤其要保护好一旦感染就可能病重的家人。

如果您怀疑自己或家人可能感染了麻疹,请远离他人,并立即联系医疗服务提供者、急诊或急救室。

做好应对麻疹的准备
cdc.gov/measles

