

當前麻疹來襲

麻疹是由病毒引發的高度傳染性疾病。它可能很兇險，尤其是對嬰幼兒而言。請保護好家人和社區。

麻疹可透過患者咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫在空氣中傳播。麻疹患者離開後，病毒仍可在空氣中存活長達 2 小時。麻疹的傳染性極強，未接種疫苗的人在近距離接觸麻疹患者後，感染風險約為 90%。



麻疹症狀會在接觸病毒後 7 至 14 天內出現。
常見的麻疹症狀包括：



高燒
(體溫可高達
104°F/40°C 以上)



咳嗽



流鼻水



眼睛發紅和/
或流淚




皮疹
(症狀出現後 3 至
5 天開始爆發)



肺炎



腦部腫脹
(腦炎)



甚至可能會
導致死亡

預防麻疹的最有效方法.....

是接種麻腮風三聯 (MMR) 疫苗。接種疫苗永遠都不算晚。接種疫苗有助於保護自己、身邊的人以及社區。如果您尚未接種疫苗，在當地麻疹病例數量下降之前，建議考慮居家或避免前往人群密集場所，尤其要保護好一旦感染就可能病重的家人。

如果您懷疑自己或家人可能感染了麻疹，請遠離他人，並立即聯絡醫療服務提供者、急診或急救室。

