


麻疹絕非僅是 輕微皮疹



麻疹可能很兇險，尤其是對嬰幼兒而言。


麻疹的典型症狀
通常包括：



發燒
(體溫可高達
40°C 以上)



咳嗽



流鼻水



眼睛發紅
和/或流淚



皮疹
(症狀出現後
3 至 5 天開始爆發)

麻疹可能會帶來嚴重後果。

麻疹會引發嚴重的健康併發症，例如肺炎、腦部腫脹(腦炎)，甚至會危及生命。



每 5 名麻疹患者中，就有 1 人需要住院治療。



每 20 名患麻疹的兒童中，就有 1 人會患上肺炎，而肺炎是幼兒因麻疹死亡的最常見原因。



每 1000 名麻疹患者中，就有 1 人會出現腦部腫脹，這可能會導致腦損傷。



每 1000 名麻疹患者中，會有 1 至 3 人死亡。

長期併發症

在麻疹康復後 7 至 10 年間，患者有可能會罹患一種極為罕見但致命的疾病——亞急性硬化性全腦炎。



您有能力保護好自己的孩子。

請確保孩子接種麻腮風三聯 (MMR) 疫苗，為他們構築安全且持久的麻疹防護屏障。請諮詢您的醫療服務提供者。