

ПІДОЗРЮЄТЕ, ЩО ВАША ДИТИНА ХВОРА НА КІР?


Що робити, якщо ви підозрюєте кір у вашої дитини?

Кір зазвичай починається з високої температури, кашлю, нежитю та почервоніння очей, після чого з'являється висип. Якщо у когось із вашої родини спостерігаються симптоми кору:

Ізольуйте хворого від членів сім'ї, у яких немає симптомів.

Усі в домі повинні залишатися вдома, щоб не заразити сусідів або інших людей поза домом.

Негайно зателефонуйте лікарю або до лікарні та повідомте, що у вашому помешканні є хворий на кір. Вам нададуть подальші вказівки.



Коли слід звертатися до відділення невідкладної допомоги?

Якщо стан хворого стрімко погіршується або з'являються будь-які з перелічених нижче симптомів, негайно доставте його до відділення невідкладної допомоги.

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ!



Утруднене або прискорене дихання



Біль при диханні або кашлі



Ознаки зневоднення (сухість у роті та носі, зменшене сечовипускання, плач без сліз)



Стійка лихоманка чи головний біль, що не проходять



Сплутаність свідомості, зниження пильності або виражена слабкість



Синюшність навколо рота, загальна млявість або труднощі з годуванням (у немовлят і маленьких дітей)

Попросіть когось зателефонувати до лікарні перед вашим приїздом і попередити, що їде хворий на кір.

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ВІД КОРУ!
cdc.gov/measles

