

HIỆN TẠI ĐANG CÓ DỊCH SỞI BÙNG PHÁT

Bệnh sởi là một bệnh rất dễ lây lan do vi-rút gây ra. Bệnh có thể nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hãy bảo vệ gia đình và cộng đồng của bạn.



Bệnh sởi lây lan qua đường không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Vi-rút có thể tồn tại trong không khí đến 2 giờ sau khi người mắc bệnh sởi rời khỏi không gian đó. Bệnh rất dễ lây lan, khoảng 9 trên 10 người tiếp xúc gần với người mắc bệnh sởi và chưa được tiêm vắc-xin bảo vệ cũng sẽ bị nhiễm bệnh.

Các triệu chứng của bệnh sởi xuất hiện từ 7 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với vi-rút. Các triệu chứng thường gặp của bệnh sởi bao gồm:



Sốt cao
(có thể lên tới trên 104°F)



Ho



Chảy nước mũi



Mắt đỏ và/hoặc chảy nước mắt



Phát ban
(xuất hiện 3-5 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu)


Bệnh sởi có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm:



Viêm phổi



Sưng não
(viêm não)



Thậm chí có thể gây tử vong



Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh sởi...

là tiêm vắc-xin sởi, quai bị và rubella (MMR). Đi tiêm phòng không bao giờ là quá muộn. Tiêm phòng giúp bảo vệ bạn, những người xung quanh bạn và cộng đồng của bạn. Nếu bạn chưa được tiêm phòng, hãy cân nhắc ở nhà hoặc tránh xa những nơi đông người cho đến khi số ca mắc bệnh sởi trong khu vực giảm xuống, đặc biệt là để bảo vệ những người trong gia đình bạn mà có thể bị bệnh rất nặng.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc ai đó trong gia đình bạn mắc bệnh sởi, hãy tránh xa người khác và gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu.