

NẾU BẠN NGHĨ CON MÌNH BỊ BỆNH SỞI?


Cần làm gì nếu bạn nghĩ con mình bị sởi

Bệnh sởi thường khởi phát với sốt, ho, chảy nước mũi và mắt đỏ, sau đó dẫn đến phát ban. Nếu có người trong gia đình bạn có các triệu chứng của bệnh sởi:

Cách ly họ với các thành viên trong gia đình không bị bệnh.

Mọi người trong nhà nên ở nhà để tránh lây bệnh cho hàng xóm hoặc những người bên ngoài gia đình.

Gọi điện ngay cho bác sĩ hoặc bệnh viện để thông báo rằng có người trong nhà bạn mắc bệnh sởi. Họ sẽ hướng dẫn bạn.




Khi nào cần đến phòng cấp cứu

Nếu người bệnh trở nặng nhanh chóng hoặc có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, hãy đưa họ đến khoa cấp cứu của bệnh viện ngay lập tức.

KHÔNG CHẦN CHỜ.



Khó thở
(hoặc thở nhanh hơn bình thường)



Đau khi thở hoặc ho



Mất nước
(khô mũi và miệng, đi tiểu ít hơn, khóc không ra nước mắt)



Sốt hoặc đau đầu không ngừng



Lú lẫn, giảm tỉnh táo hoặc suy nhược nghiêm trọng



Môi tái xanh, lơ đãr, hoặc bú khó
(đối với trẻ nhỏ)

Nhờ người gọi điện thoại trước khi bạn đến. Thông báo cho bệnh viện biết rằng có người mắc bệnh sởi đang đến.